

Езомепразол 40 мг для парентерального введення

# ДЕСПАЗОЛ

Інгібітор  
протонної  
помпи

- ✓ ТЕРАПЕВТИЧНА БЕЗПЕКА<sup>1</sup>
- ✓ ВИСОКА КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ<sup>2</sup>
- ✓ ДОВГОТРИВАЛИЙ КОНТРОЛЬ КИСЛОТНОСТІ<sup>3</sup>
- ✓ НИЗЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВЗАЄМОДІЇ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ<sup>4</sup>

Сила дії —  
довготривалий  
контроль



1. Hasselgren G., Röhss K., Hedenstrom H. Effect of esomeprazole 40 mg vs omeprazole 40 mg on 24-hour intragastric pH in patients with symptoms of GERB. Digest // Diseases And Sciences. — 2002. — Vol. 47, № 5, Röhss K., Bondarov P., Lundin C., Nilsson-Pleschi C., Nyman L., Niazi M. Esomeprazole 40 mg administered as a 30-minute intravenous infusion provides the same effective acid control as oral administration in healthy subjects (Abstract) // Gastroenterology. — 2003. — 122 (4 Suppl.). — A231.

2. Richter et al 2001; Scheiman et al 2003; Yeomans et al 2003 NASA 1 & SPACE 1, PLUTO & 289; Hawkey et al 2004.

3. Kahrilas et al 2000; Labenz et al 2000; Lind et al 2000; Miner et al 2003; Röhss K., et al, Intl J Clin Pharm Ther 2007; 45:345–54.

4. Andersson T., et al. Clin Pharmacokinet 2001; 40(7):523–537. 2. Hassan-Alin, M., et al., Clin Drug Investig 2005; 25(11):731-740. Siller-Matula J., et al., Am Heart J 2009; 157:148, e1-e5, Saccar CI. Expert Opinion on Drug Metabol and Toxicol 2009; 5(9): 1113-24, Estborn L., Joelson S, Drug Sal 2008; 31(7): 627-638.



# ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

# ДЕСПАЗОЛ

**Склад.** 1 флакон містить езомепразол натрію, що еквівалентно езомепразолу 40 мг

**Лікарська форма.** Ліофілізат для розчину для ін'єкцій

**Фармакотерапевтична група.** Засоби для лікування пептичної виразки та GERX. ІПН. Езомепразол. Код АТС А02В С05

**Показання.** *Дорослі.*

- Антисекреторна терапія у разі, коли неможливо застосовувати пероральний шлях введення, наприклад:
  - GERX у пацієнтів з езофагітом та/або тяжкими симптомами рефлюксу;
  - лікування виразок шлунка, пов'язаних з терапією НПЗЗ;
  - попередження виразок шлунка та 12-ти паллої кишки, пов'язаних з терапією НПЗЗ, у пацієнтів, які входять до групи ризику.
- Короткотривале підтримання гемостазу та профілактика повторної кровотечі у пацієнтів після ендоскопічного лікування гострої кровотечі внаслідок виразки шлунка або 12-ти паллої кишки.

*Діти віком від 1 року.* Антисекреторна терапія у разі, коли неможливо застосовувати пероральний шлях введення, наприклад:

GERX у пацієнтів з ерозивним рефлюксним езофагітом та/або тяжкими симптомами рефлюксу.

**Спосіб застосування та дози.**

*Дорослі.* Доза для пацієнтів із рефлюксним езофагітом становить 40 мг 1 раз на добу. Доза для пацієнтів, які одержують симптоматичне лікування рефлюксної хвороби, або при лікуванні чи для запобігання виразок шлунка, зумовлених застосуванням НПЗЗ, становить 20 мг 1 раз на добу.

Після терапевтичної ендоскопії гострої кровотечі виразок шлунка або 12-ти паллої кишки вводити 80 мг л.з. у вигляді болюсної інфузії 30 хв, після чого продовжують введення препарату у вигляді тривалої в/в інфузії зі швидкістю 8 мг/год впродовж 3 днів (72 години).

*Діти.* Лікування ерозивного рефлюксного езофагіту: діти віком 1-11 років з масою тіла <20 кг — 10 мг; ≥20 кг — 10 або 20 мг 1 раз на добу; 12–18 років — 40 мг 1 раз/добу.

Симптоматичне лікування GERX: діти віком 1–11 років — 10 мг 1 раз/добу, 12–18 років — 20 мг 1 раз на добу.

**Спосіб застосування.**

Розчин для в/в ін'єкції (5 мл 0,9 % NaCl для в/в застосування додати до флакону езомепразолу 40 мг) вводити щонайменше 3 хв.

Розчин для інфузій (розчинити вміст 1 флакону езомепразолу 40 мг у 100 мл 0,9 % NaCl для в/в застосування) вводити в/в 10–30 хв.

Доза 8 мг/год. Відновлений розчин вводити у вигляді тривалої в/в інфузії протягом 71,5 години (розрахована швидкість інфузії 8 мг/год).

**Упаковка.** 1 флакон у паці з картоном

**Категорія відпуску.** За рецептом

**Виробник.** Напрод Лайф Саенсес Пвт. Лтд

**Заявник.** М. Біотек Лтд, Гледстоун Хауз, 77-79 Хай Стріт, Егам ТВ20 9ГИ, Суррей, Велика Британія

**Імпортер.** Представництво «ДЕСПІНА ФАРМА ЛТД»: 03179, м. Київ, вул. Академіка Єфремова, буд. 19-А, оф. 3. Тел.: +38(044) 424 6540